POP 05 - ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL

Objetivo: Os medicamentos são fornecidos pela boca e deglutidos com líquido. A maioria das drogas de administração oral são feitas para serem ativadas no estômago e absorvidas através da mucosa gástrica.

Algumas vantagens:

- Auto ingestão;
- Reversão da administração (possibilidade);
- Indolor (geralmente).

Execução: Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem

Materiais:

1. Bandeja
2. Medicamento
3. Recipiente descartável para colocar o medicamento (copo) ou copo dosador/seringa
4. Copo descartável para água

Procedimento:

1. Revise as informações pertinentes relacionadas com o medicamento: ação, finalidade, efeitos colaterais, horário do início da ação e da ação máxima, e implicações de enfermagem;
2. Checar os nove certos descritos na POP 4;
3. Higienizar as mãos conforme POP 2;
4. Seguir POP 4 Orientações Gerais;
5. Colocar o(s) medicamento(s) embalado(s) em um copo descartável;
6. Avaliar capacidade de engolir, tossir e reflexo de vômito do paciente e, medianteidentificação de anormalidades ou dúvidas, comunicar o médico;
7. Em caso de líquido – agitar o frasco e colocar a dose prescrita com auxílio do copograduado, ou conta gotas e verificar a quantidade de medicamento ao nível dos olhos;
8. Medicamentos líquidos mantidos em geladeira, verificar a data de abertura do frasco;
9. Explicar o procedimento ao paciente;
10. Oferecer a medicação;
11. Certificar-se que o medicamento foi deglutido;

12. Observar possíveis reações, queixas, bem como se o efeito foi o desejado;
13. Higienizar as mãos;
14. Manter ambiente de trabalho limpo e organizado.

Registro: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário individual e eletrônico.

OBSERVAÇÃO:

1. Blister e strip somente poderão ser cortados se puderem ser identificados individualmentecom: nome do medicamento, teor, data de validade e lote.
2. Avaliar a necessidade do uso de luvas.
3. Nem todos os medicamentos podem ser macerados, assim, em caso de dúvidas consulte ofarmacêutico.