POP 10 - VIA RETAL

Objetivo: Administrar medicamentos pela via retal. Via de administração de medicamentos, que consiste na absorção de fármacos pela mucosa anal. É indicada quando há intolerância do cliente ao fármaco por via oral ou por outras impossibilidades (sondagem oral, presença de ferimentos na boca, etc.). A medicação é formulada na forma de supositório e ou enema retal eaplicada no esfíncter anal interno ou reto.

Execução: Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.

Materiais:

1. Bandeja;
2. Supositório;
3. Luva de procedimento;
4. Gaze;
5. Biombo

Procedimento:

1. Higienizar as mãos conforme POP 2;
2. Colocar luvas e explicar o procedimento ao paciente;
3. Atenção à manutenção da privacidade do paciente, fechar portas e cercar o leito combiombos s/n;
4. Posicionar o paciente na posição Sims (Decúbito lateral esquerdo);
5. Afastar os glúteos com auxílio de uma gaze;
6. Introduzir o supositório, pelo ânus até o esfíncter interno e contra a parede do reto, 10 cm no adulto e 5 cm na criança e bebê, solicitando ao paciente que não tente fazer força de evacuar;
7. Aplique uma pressão para segurar as nádegas para manter a medicação no lugar;
8. O paciente deverá permanecer na mesma posição por 5 minutos se conseguir;
9. Higienizar as mãos;
10. Deixar o ambiente em ordem.

Registro: Registrar o procedimento realizado, aceitação ou recusa do paciente, data e horário do procedimento, resultado da evacuação (quantidade, aspecto e consistência das fezes),carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário e registro em prontuário eletrônico.