POP 28 - ADMINISTRAÇÃO DE ZOLADEX (Acetato de gosserrelina)

Objetivo: Administrar Zoladex via subcutânea.

Execução: Enfermeiro, Médico.

Material:

1. Bandeja;
2. Algodão;
3. Álcool à 70%;
4. Esparadrapo;
5. Gaze;
6. Luvas de procedimentos;
7. Recipiente para descarte de resíduo infectante;

Procedimento:

1. Explicar o procedimento ao paciente;
2. Higienizar as mãos;
3. Conferir a prescrição e verificar o nome do usuário, o medicamento, a dose, a via;
4. Perguntar ao paciente se já realizou aplicações anteriores do medicamento;
5. Conferir se o medicamento está conservado em temperatura, conforme orientação dofabricante, se a embalagem esta integra, conferir validade;
6. Orientar o paciente para que fique em uma posição confortável, com a parte inferior docorpo discretamente levantada.
7. Expor o abdômen do paciente para aplicação do medicamento e verificar se o depósito de Zoladex está visível;
8. Retirar a aba protetora plástica da seringa e a cobertura da agulha e descartá-la;
9. Realizar a antissepsia do local após a aplicação com algodão embebido em álcool a 70%;
10. Realizar a prega cutânea com a mão não dominante;
11. Segurar a seringa com o bisel voltado para cima;
12. Inserir a agulha no tecido subcutâneo com ângulo de 30 a 45 graus em relação à pele, até que a capa protetora toque a pele do paciente;
13. Pressionar o êmbolo da seringa até um ponto que não consiga mais fazê-lo – isso vai ativara capa protetora e você poderá ouvir um clique e sentirá que a

capa protetora, automaticamente, começará a deslizar para cobrir a agulha. Se o embolo não for totalmentepressionado, a capa protetora não será ativada. Se isto ocorrer, retirar a agulha e deixar quea capa protetora deslize e recubra a agulha;

14. Desprezar a seringa no coletor de descarte de perfuro cortante;
15. Realizar um curativo compressivo no local da aplicação;
16. Orientar o paciente sobre possíveis eventos adversos;

OBSERVAÇÃO:

Não tentar remover bolhas de ar pois Zoladex não é uma injeção líquida e isso poderá deslocaro depot do medicamento. O medicamento deve ser conservado em temperatura inferior a 25ºCe não pode ser congelado. Atentar a pacientes com baixo IMC e/ou que estejam recebendo medicamentos anticoagulantes de longa duração.

Registro: Registrar a administração no sistema, identificando lado administrado e lote do medicamento.