POP 19 - SONDAGEM NASOGÁSTRICA

Objetivo: Realizar inserção de sonda gástrica sem mandril por via nasal para alimentação,administração de medicamentos e drenagem de conteúdo gástrico.

Execução: Medico e enfermeiro

Material:

1. Bandeja
2. Luvas de procedimento;
3. Sonda gástrica;
4. Seringa 20 ml;
5. Gel lubrificante hidrossolúvel ou anestésico gel à 2%;
6. Micropore ou esparadrapo;
7. Cordonê;
8. Estetoscópio;
9. Biombo;
10. Equipamentos de Proteção Individual.

Procedimento:

1. Verificar a prescrição do médico para a inserção da sonda nasogástrica;
2. Higienizar as mãos conforme POP 2;
3. Preparar o material;
4. Levar o material para a unidade do paciente;
5. Explicar o procedimento ao paciente e/ou acompanhante;
6. Fechar a porta ou colocar biombo para garantir a privacidade do paciente;
7. Posicionar o paciente em decúbito dorsal e elevar a cabeceira da cama;
8. Medir a sonda da ponta do nariz ao lóbulo da orelha e deste até o apêndice xifoide,acrescentar aproximadamente 2 cm à medida;
9. Marcar o local da medida envolvendo a sonda com esparadrapo ou micropore;
10. Calçar luvas de procedimento;
11. Lubrificar a ponta da sonda com o gel lubrificante hidrossolúvel ou anestésico gel à 2%;
12. Escolher em qual narina a sonda será introduzida;
13. Introduzir a sonda na narina selecionada até chegar à demarcação da medida, solicitando ao paciente que degluta quando possível;
14. Realizar testes de posicionamento: 1) conectar a seringa e aspirar um pouco de conteúdo gástrico com a seringa; 2) Injetar aproximadamente 20 ml de ar de maneira rápida e concomitantemente, colocar o estetoscópio sobre o estômago, procurando ouvir um ruído surdo borbulhante.
15. Se os testes indicarem posicionamento correto da sonda, colocar o cordonê envolto à sondae fixá-lo ao nariz e à região frontal com o micropore;
16. Em caso de prescrição de drenagem de conteúdo gástrico, conectar a ponta da sonda diretono frasco coletor ou conectar a ponta da sonda em um equipo e este ao frascocoletor.

OBSERVAÇÃO:

Por parecer do COREN, sondas COM MANDRIL mesmo que seja a nível gástrico,

somente poderá ser realizada pelo enfermeiro.

Sondas COM MANDRIL mesmo que seja a nível gástrico deverá ser realizado Raio-X para confirmar posicionamento correto da sonda;

Registro: Registrar o procedimento realizado, por qual narina a sonda foi introduzida, os testesde posicionamento da sonda, se ocorreram intercorrências durante o procedimento, data e horário do procedimento, carimbo e assinatura de quem realizou a técnica em prontuário ou Ficha de atendimento ambulatorial.

REFERENCIA

CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM. RESOLUÇÃO COFEN N° 619/2019: Normatização da atuação da Equipe de Enfermagem na Sondagem Oro/nasogástrica e Nasoentérica.. 2019. Disponível em: http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-619-2019_75874.html. Acesso em: 14 abr. 2023.