



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO



**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DE BATATAIS**  
Rua Dona Adorama, n.º 420 – Tel: 3662-1779 – CEP: 14300-069  
Batatais – SP – e-mail: [vebatatais@batatais.sp.gov.br](mailto:vebatatais@batatais.sp.gov.br)

## VACINA CONTRA COVID XBB

### Estratégia de vacinação contra a Covid-19 em 2024

- ✓ No dia 06 de março de 2024, a ANVISA aprovou o registro definitivo da vacina monovalente contra a Covid-19 atualizada para a variante XBB 1.5
- ✓ Tecnologia: RNAm, proteína *spike*
- ✓ Indicação: ≥ 6 meses de idade
- ✓ Via intramuscular
- ✓ Mesma apresentação para crianças e adultos (doses diferentes – 0,25mL e 0,5mL)



### Vacinação na ROTINA (tabela 1 e 2)

- **Meta de vacinação:**
  - 90% da população alvo.
  - Indicador de cobertura vacinal: até 1 ano de idade
- **Esquema de vacinação para o esquema primário: DUAS** doses (1ª DOSE + 2ª DOSE) da vacina COVID-19 monovalente (XBB), fabricante Moderna. O intervalo recomendado é de **4 semanas** entre a primeira e a segunda doses.

### Vacinal anual para grupos prioritários

- **População alvo:** pessoas com **5 anos de idade ou mais** e com maior vulnerabilidade ou condição que aumenta o risco para formas graves da doença.
- **Meta de vacinação:**
- >90% da população alvo
- Cobertura vacinal: pessoas com 60 anos ou mais, gestantes/puérperas, população indígena que vive em terras indígenas



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO



- **Recomendação:**
- **DOSE ANUAL** para a maioria dos grupos
- Pessoas com 60 anos ou mais, imunocomprometidos e gestantes/puérperas: **DUAS DOSES** com intervalo de **6 meses** entre elas.
- **Intervalo mínimo** entre a última dose de qualquer vacina COVID-19 e a dose da vacina XBB: **3 MESES**
- **Esquema primário: UMA DOSE** a partir da utilização da vacina XBB para os grupos prioritários

Tabela1

Idade	Dose	Intervalo entre as doses
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, sem vacinação prévia	<b>Dois</b> doses de 0,25 ml, administradas por via intramuscular *	Administrar a segunda dose com intervalo de <b>4 semanas</b> após a primeira dose
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade, com vacinação prévia completa (três doses)	Uma dose de 0,25 ml, administrada por via intramuscular *	Administrar uma dose pelo menos <b>três meses após a dose</b> mais recente de qualquer vacina Covid-19 cepa original
Crianças de 6 meses a 4 anos de idade <b>IMUNOCOMPROMETIDA</b>	<b>Três</b> doses de 0,25 ml, administradas por via intramuscular *	Intervalo de <b>4 semanas</b> da 1ª para 2ª dose e de <b>8 semanas</b> da 2ª para a 3ª dose

\* Não utilizar a seringa preenchida de dose única (0,5 ml) para administrar o volume de 0,25 ml.

Tabela2

Vacina prévia	Esquema prévio	Recomendação	Intervalo mínimo
Pfizer baby (Comirnaty)	Se a criança recebeu <b>uma (1) dose</b>	Receberá mais <b>duas doses</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
	Se a criança recebeu <b>duas (2) doses</b>	Receberá mais <b>uma dose</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
	Se a criança recebeu <b>três (3) doses</b>	Receberá mais <b>uma dose</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	Pelo menos <b>três meses</b> após a D3



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO



<b>Coronavírus (crianças de 3 e 4 anos em situações específicas)</b>	Se a criança recebeu <b>uma (1) dose</b>	Receberá mais <b>duas doses</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
	Se a criança recebeu <b>duas (2) doses</b>	Receberá mais <b>uma dose</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3 (Reforço): <b>4 meses</b>
	Se a criança recebeu <b>três (3) doses</b>	Receberá mais <b>uma dose</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	Pelo menos <b>três meses</b> após a D3 (reforço)
<b>Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)</b>	Se a criança recebeu <b>uma (1) dose</b>	Receberá mais <b>uma dose</b> da vacina Covid-19 monovalente XBB (Spikevax)	D1 para D2: 4 semanas
	Se a criança recebeu <b>duas (2) doses</b>	_____	D1 para D2: 4 semanas

## Vacinação dos grupos prioritários a partir de 5 anos de idade

<b>Grupo prioritário</b>	<b>Intervalo entre as doses</b>
Pessoas de 60 anos ou mais	6 meses
Pessoas imunocomprometidas	6 meses
Gestantes e puérperas	6 meses
Pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI), e seus trabalhadores	Anual
Indígenas	Anual
Quilombolas	Anual
Trabalhadores da saúde	Anual
Pessoas com deficiência permanente	Anual
Pessoas com comorbidades	Anual
Pessoas privadas de liberdade (≥ 18 anos)	Anual
Funcionários do sistema de privação de liberdade	Anual
Adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas	Anual
Pessoas em situação de rua	Anual

Fonte: DPNI/SVSA/MS



**Vacinação dos grupos prioritários a partir de 5 anos de idade -  
IMUNOCOMPROMETIDOS**

➤ **Recomendação:**

1. Não vacinados: **3 DOSES (esquema primário) (4 sem e 8 sem)**
2. Incompletamente vacinados: **completar esquema de 3 DOSES (esquema primário)**
3. Vacinados: **2 DOSES** com intervalo de 6 meses entre elas

**Definição de indivíduos imunocomprometidos ou em condição de imunossupressão**

- ✓ Pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea
- ✓ Pessoas vivendo com HIV (PVHIV)
- ✓ Pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses  $\geq 20$  mg/dia de prednisona, ou equivalente, por  $\geq 14$  dias
- ✓ Crianças: doses de prednisona, ou equivalente,  $\geq 2$ mg/Kg/dia por mais de 14 dias até 10Kg.
- ✓ Pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão
- ✓ Pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias)
- ✓ Pessoas com doença renal crônica em hemodiálise
- ✓ Pacientes oncológicos que realizam ou realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico e estão em acompanhamento
- ✓ Pessoas com neoplasias hematológicas

**Comprovação:** apresentação de medicamentos em uso ou resultados de exames ou receitas médicas ou relatórios/declarações médicas ou qualquer outro documento que evidencie a situação do imunocomprometimento do indivíduo.

- O registro de doses aplicadas será no **VaciVida** e deve-se escolher as seguintes estratégias de vacinação:

**SEMPRE NO VACIVIDA**

- ✓ **Crianças entre 06 meses e 04 anos, 11 meses e 29 dias** – as doses aplicadas deverão ser registradas na estratégia de vacinação **ROTINA**;
- ✓ **Pessoas com 05 anos ou mais de idade** – deverão suas doses registradas na estratégia de vacinação **CAMPANHA SELETIVA**.



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO



## RECOMENDAÇÕES E DOSES DA VACINA COVID-19 (XBB), FABRICANTE MODERNA, PARA INDIVÍDUOS IMUNOCOMPROMETIDOS > 5 ANOS DE IDADE

Idade	Dose da vacina Covid-19 XBB, fabricante Moderna	Recomendações adicionais
Crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos de idade, <b>sem vacinação prévia</b>	<b>Três</b> doses de 0,25 ml, administrada via intramuscular*	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
Crianças imunocomprometidas de 5 a 11 anos de idade, <b>com vacinação prévia (aos menos 2 doses)</b>	<b>Uma</b> dose de 0,25 ml, administrada via intramuscular*	A vacina Covid-19 XBB, fabricante Moderna, deverá ser administrada pelo menos 3 meses da dose mais recente de qualquer vacina Covid-19 (original ou bivalente). Estes grupos poderão receber até 2 doses em 2024 com intervalo de seis meses entre elas.
Indivíduos imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade <b>sem vacinação prévia</b>	<b>Três</b> doses de 0,5 ml, administrada via intramuscular	D1 para D2: 4 semanas D2 para D3: 8 semanas
Indivíduos imunocomprometidos a partir de 12 anos de idade <b>com vacinação prévia (aos menos 2 doses)</b>	<b>Uma</b> dose de 0,5 ml, administrada via intramuscular	A vacina Covid-19 XBB, fabricante Moderna, deverá ser administrada pelo menos <b>3 meses</b> da dose mais recente de qualquer vacina Covid-19 (original ou bivalente). Estes grupos <b>poderão receber até 2 doses</b> em 2024 com intervalo de seis meses entre elas.

## OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

### ADMINISTRAÇÃO SIMULTÂNEA COM OUTRAS VACINAS OU MEDICAMENTOS OU IMUNOBIOLÓGICOS

\*\*As vacinas COVID-19 podem ser administradas simultaneamente, ou a qualquer momento antes ou depois de outras vacinas para adultos, adolescentes e crianças, incluindo vacinas atenuadas e inativadas, **exceto com a vacina contra a dengue (24h)**

\*\*De acordo com a Anvisa, os candidatos elegíveis à **doação de sangue** que tiverem sido vacinados contra a covid-19 devem ser



# PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE BATATAIS

ESTADO DE SÃO PAULO



considerados inaptos temporariamente pelo período de **7 dias após a vacinação**, se as vacinas forem de RNAm.

## **TRANSIÇÃO DE IDADES:**

Seguir o esquema de vacinação recomendado para a idade atual.

Ex.: recebeu a D1 (original) aos 4 anos de idade e retornou para receber a D2 aos 6 anos de idade

- ✓ Se **não for do grupo de risco** – considerar esquema encerrado.
- ✓ Se **for do grupo de risco** – administrar uma dose vacina atualizada XBB e encerrar o esquema.

## **Contra indicações**

- Indivíduos com histórico conhecido de **reação alérgica grave** a qualquer componente da vacina;

## **Precauções**

- Reações alérgicas: triagem e observação;
- Gravidez e amamentação: não há aumento do risco para reações
- Pessoas imunocomprometidas: eficácia pode ser menor
- Reações de estresse à vacinação (VER)


## **Composição:**

- Ingrediente ativo
- Excipientes
  - SM-102, colesterol, 1,2-distearoil-sn-glicero-3- fosfocolina (DSPC)
  - 1,2-Dimiristoil-rac-glicero-3-metoxipoli(etil)enoglicol-2000 (PEG2000-DMG)
  - Trometamol
  - Cloridrato de trometamol
  - Ácido acético
  - Sódio acetato tri-hidratado
  - Sacarose
  - Água para preparações injetáveis

## Eventos adversos não graves – 18 anos ou mais

### Vacina Covid-19 monovalente XBB

- Eventos adversos não graves –  
18 anos ou mais



### Farmacovigilância

- Garantir a segurança da vacinação contra a covid-19
- Monitorar a ocorrência de ESAVI
- Detectar e avaliar sinais de segurança
- Identificar e investigar conglomerados e surtos
- Promover comunicação efetiva
- Gerar evidências e subsidiar a tomada de decisão

### ESAVI

- Qualquer ocorrência médica indesejada ou não intencional após a vacinação, não possuindo necessariamente uma relação causal com o uso de uma vacina ou outro imunobiológico
  - Não graves (por exemplo, dor local ou febre)
  - Graves
    - ✓ Notificação compulsória imediata (no máximo de 24 horas) – e-SUS Notifica
    - ✓ Investigação (sanitária, clínica e epidemiológica) – em 48 horas
    - ✓ Classificação de causalidade